

Pengaruh Indeks Massa Tubuh Terhadap Respon Klopидогрел pada Pasien Sindrom Koroner Akut dengan Intervensi Koroner Perkutan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta = Impact of Body Mass Index on Clopidogrel Responses After Percutaneous Coronary Intervention at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta

Marlina Qurratul Aini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20489028&lokasi=lokal>

Abstrak

Klopидогрел, agen antiplatelet pasca Intervensi Koroner Perkutan (IKP), merupakan obat yang profil farmakokinetik dan farmakodinamiknya dipengaruhi oleh Indeks Massa Tubuh (IMT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IMT terhadap respon klopидогрел pada pasien Sindrom Koroner Akut (SKA) setelah IKP. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang terhadap 143 rekam medis pasien SKA dengan IKP di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada tahun 2018. Subyek dikelompokkan berdasarkan IMT, yakni kategori berat badan berlebih dan kategori berat badan tidak berlebih. Respon klopидогрел dinilai menggunakan luaran *Major Adverse Cardiac Event* (MACE) dalam tiga puluh hari pertama. Hasil dari penelitian adalah (a). Secara signifikan subyek dengan berat badan berlebih memiliki risiko terjadi MACE lebih tinggi dibanding subyek dengan berat badan tidak berlebih ($PR = 6,792$, CI 1(1,498 – 30,805). (b). Tidak ada variabel perancu yang berhubungan dengan MACE kecuali jenis klopидогрел. Subyek dengan klopидогрел generik bersifat proteksi terhadap MACE dibanding subyek dengan klopидогрел paten (Plavix) ($PR 0,098$, CI 0,013 -0,753). Kesimpulan dari penelitian ini adalah IMT berpengaruh secara signifikan terhadap MACE.

<hr /><i>Clopidogrel, antiplatelet agent after Percutaneous Coronary Interventions (PCI), is drug with high individual pharmacokinetic and pharmacodynamic variability interfered by Body Mass Index (BMI). The aim of this study is to assess impact of BMI on clopidogrel responses after PCI. This comparative cross-sectional study was conducted in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta using 143 Acute Coronary Syndrome (ACS) patient health record years of 2018. Patients were randomly assigned into two groups based on BMI, overweight and normal weight groups. Results of this study are: (a). Overweight patient have higher MACE risk than normalweight patient ($PR = 6,792$, CI 1(1,498 – 30,805). (b) . No confounding variables are associated with MACE, except type of clopidogrel. Generic clopidogrel have protective effect of MACE (($PR 0,098$, CI 0,013 -0,753).</i>