

# The Cut-Off point for correction of vertical orbital dystopia based on visual subjective perception assessment among plastic surgery residents = Ambang batas koreksi distopia vertikal orbita berdasarkan persepsi subjektif visual residen bedah plastik

Sitorus, Ade Sari Nauli, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20490299&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

**Latar belakang:** Manusia sering mendekati simetri wajah yang minimal. Koreksi bedah diindikasikan bila distopia orbital > 5 mm dan/ atau disertai dengan disfungsi visual seperti diplopia. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi batas untuk koreksi distopia orbital vertikal dengan penilaian subjektif visual.

**Metode:** Penelitian ini merupakan studi *preliminary* dengan desain potong-lintang analitik. Empat puluh delapan residen bedah plastik diminta untuk mengevaluasi secara subjektif pada 60 foto yang dimanipulasi dan diacak secara digital yang memperlihatkan distopia orbital 0 hingga 5 mm. Jawaban dimasukkan pada formulir skala Likert. Data diproses dan dianalisis menggunakan SPSS 22.0.

**Hasil:** Sebanyak 48 residen dari dua pusat pendidikan bedah plastik (Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Ciptomangunkusumo) terdaftar dalam penelitian. Berdasarkan kurva ROC, batas distopia yang dapat dideteksi secara subjektif adalah 2.5 milimeter. Indikasi koreksi berdasarkan penilaian subjektif secara visual pada responden, 46.3% setuju dilakukan bila disropia < 5 mm, sementara 69.9% menjawab setuju dilakukan bila dystopia ≥ 5 mm.

**Kesimpulan:** Batas dystopia yang dapat dideteksi secara subjektif adalah 2.5 milimeter. Responden yang menjawab setuju dilakukan koreksi yaitu sebanyak 46.3% untuk dystopia < 5 mm dan 69.9% untuk dystopia ≥ 5 mm. Walaupun persentase jawaban setuju dilakukan koreksi pada dystopia < 5 mm lebih sedikit dibanding dystopia ≥ 5 mm, namun angka ini dapat menjadi acuan pertimbangan untuk dilakukan koreksi pada dystopia. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan dengan subjek yang lebih bervariasi dan lebih banyak.

**Keywords:** orbital dystopia, subjective assessment, aesthetic

**Background:** People can detect even a subtle facial asymmetry. Surgical correction is indicated if orbital dystopia is 5 mm and more and/or along with visual dysfunction such as diplopia. This study aims to investigate the cut off point for correction of vertical orbital dystopia by visual subjective assessment.

**Methods:** This is a preliminary analytic cross-sectional study. Forty-eight plastic surgery residents were asked to subjectively evaluate 60 digitally manipulated photographs showing 0 to 5-millimeter orbital dystopia using Likert scale form. Data was processed and analyzed using SPSS 22.0.

**<strong>Result:** A total of 48 plastic surgery residents from two centres (Hasan Sadikin and Ciptomangunkusumo Hospital) were enrolled. According to the ROC curve, the cut-off point of dystopia that can be detected subjectively is 2.5 millimetre. Regarding indication for corrective surgery, 46.3% respondents agreed for correction on dystopia <5 mm, while 69.9% agreed for correction on dystopia  $\geq$  5 mm.

**<strong>Conclusion:** The cut-off point of dystopia that can be detected by visual subjective perception is 2.5 millimetres. Respondents who agree for correction of dystopia <5 mm and  $\geq$  5 mm were 46.3% and 69.9%, respectively. Although there were fewer respondents agreeing for correction on dystopia <5 mm, it can still be used as consideration for subjective criterion in correcting dystopia correction. Further study with more varied and larger sample is needed.

**<strong><em>Keywords:** </strong>orbital dystopia, subjective assessment, aesthetic</i>