

Hubungan antara tingkat spiritualitas dengan kualitas hidup pasien TB resisten obat di Poliklinik TB Resistensi Obat = The relationship between spirituality level and the quality of life of Multi Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) patients at the Tuberculosis Clinics

Fajar Veri Suprianto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20492078&lokasi=lokal>

Abstrak

Faktor spiritualitas merupakan faktor yang krusial dalam memengaruhi kualitas hidup pasien Tuberkulosis resisten obat (TB-RO), selain faktor fisik, psikologi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat spiritualitas dengan kualitas hidup pasien TB-RO. Penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan potong lintang ini melibatkan 134 pasien poliklinik TB-RO di Rumah Sakit Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Tingkat spiritualitas diukur dengan kuesioner WHO-SRPB dan kualitas hidup diukur dengan WHOQOL BREF. Hasil uji Chi Square menunjukkan ada hubungan antara tingkat spiritualitas dan kualitas hidup pada pasien TB-RO ($\chi^2 = 26,435$; $p < 0,001$). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden dengan tingkat spiritualitas rendah berisiko 7,988 kali memiliki kualitas hidup rendah. Faktor lain yang juga berhubungan dengan kualitas hidup pasien TB-RO yaitu dengan usia ($\chi^2 = 5,468$; $p = 0,019$); jenis kelamin ($\chi^2 = 38,311$; $p < 0,001$), status pernikahan ($\chi^2 = 6,269$; $p = 0,012$), penghasilan keluarga ($\chi^2 = 23,141$; $p < 0,001$), riwayat merokok masa lalu ($\chi^2 = 41,909$; $p < 0,001$). Penelitian ini merekomendasikan bidang keperawatan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur mengenai pemberian asuhan keperawatan spiritual dan perawat diharapkan dapat melibatkan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien TB-RO.

<hr>

Spirituality are a crucial factor in influencing the quality of life of Multiple drug-resistant tuberculosis patients (MDR-TB), in addition to physical, psychological, social, and environmental factors. This study aimed to determine the relationship between the spirituality level and the quality of life of MDR-TB patients in the MDR TB clinics at dr. M. Goenawan Partowidigdo Lungs Hospital. This study used a comparative descriptive with a cross sectional design approach with a sample of 134 patient and use the purposive sampling technique. The study employed the WHO-SRPB questionnaire to determine the patient's spirituality level, and WHOQOL BREF to determine the patient's quality of life. The results of the study showed a significant relationship between the spirituality level and quality of life ($\chi^2 = 26.435$; $p = 0.001$); respondents with low spirituality levels are at a risk of 7.988 times more likely to have low quality of life. Other factors that are also related to the quality of life of TB-RO patients are age ($\chi^2 = 5,468$; $p = 0,019$); gender ($\chi^2 = 38,311$; $p = 0,001$); marriage status ($\chi^2 = 6,269$; $p = 0,012$); family income ($\chi^2 = 23,141$; $p = 0,001$), past smoking history ($\chi^2 = 41,909$; $p = 0,001$). This study recommends the Manager of nursing to develop Operational Standards Procedures regarding the provision of spiritual nursing care and nurses are expected to involve families to improve the quality of life of TB-RO patients.