

Analisis asuhan keperawatan terhadap pengaruh latihan menelan dengan metode sucking lollipop pada pasien stroke iskemik di RSUPN Cipto Mangunkusumo = Analysis of nursing care against the influence of swallowing exercises with methods of sucking lollipop in ischemic stroke patients in Dr. Cipto Mangunkusumo National general Hospital

Indri Lufiyani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20492427&lokasi=lokal>

Abstrak

Kejadian disfagia ditemukan lebih dari 50 persen pada pasien stroke di fase akut. Penangan disfagia sering kali tertunda dan berdampak pada ketidakadekuatan pemenuhan kebutuhan dasar seperti dehidrasi bahkan malnutrisi. Selain itu, Pasien stroke dengan disfagia rentan mengalami pneumonitis aspirasi. Sehingga penanganan yang cepat difase akut sangat dibutuhkan. Tujuan dari karya tulis ini untuk menganalisis pemberian latihan menelan dengan metode *sucking lollipop*. Metode yang dilakukan diawali dengan skrining disfagia menggunakan format *Massey Bedside Swallowing Screen* (*MBS*) dan penentuan derajat keparahan disfagia dengan *The Dysphagia Outcome and Severity Scale* (*DOSS*). Kemudian dilakukan latihan menelan sebanyak sehari satu kali sebelum makan siang dengan durasi 10 menit. Selama tiga hari berturut-turut dilakukan penilaian kekuatan sucking lollipop dengan format *Candy Sucking Test* (*CST*). Hasil studi kasus ini ditemukan adanya peningkatan fungsi oral yaitu pergerakan lidah. Penilaian pada hari keempat *MBS* negatif dan *DOSS* menjadi normal diet skala 7. Selain itu, tidak terdapat aspirasi saat dilakukan pemberian makan secara bertahap dan pernyataan secara verbal makanan yang tersangkut di tenggorokan, serta tidak ditemukan demam. Untuk itu, pemberian lollipop mampu menjadi salah satu intervensi yang dapat perawat gunakan untuk mempercepat pengembalian kemampuan menelan pada pasien stroke di fase akut.

<hr>

The incidence of dysphagia is found to be more than 50 percent in stroke patients in the acute phase. Handlers of dysphagia are often delayed and have an impact on the inability to fulfill basic needs such as dehydration and even malnutrition. In addition, stroke patients with susceptible dysphagia experienced aspiration pneumonitis. So fast-paced acute feeding is needed. The purpose of this paper is to analyse the giving of exercises swallowing with the method of sucking lollipop. The methods initiated by screening were dysphagia using the *Massey Bedside Swallowing Screen* (*MBS*) and determining the severity of dysphagia with *The dysphagia Outcome and Severity Scale* (*DOSS*). Then, practice swallowing as much as a day once before lunch with a duration of 10 minutes. For three consecutive days conducted an assessment of the power sucking lollipop in the format of *Candy Sucking Test* (*CST*). The results of this case study found that an increase in oral function was tongue movement. Assessment on the fourth day of *MBS* is negative and *DOSS* become a normal diet scale 7. In addition, there are no aspiration during gradual feeding and verbal statements of food stuck in the throat, and no fever is found. For that, giving Lollipop is capable of being one of the interventions that nurses can use to accelerate the return of swallowing ability in stroke patients in the acute phase.