

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan kewaspadaan standar pada perawat instalasi gawat darurat dan ruang perawatan intensif di rumah sakit = Realating factors towards standards precautions compliance of nurses at the emergency and intensive care unit in a hospital

Intan Mulia Sari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20492745&lokasi=lokal>

Abstrak

Terbatasnya waktu respon, penurunan daya tahan tubuh, serta banyaknya prosedur invasif yang dilakukan perawat kepada pasien menjadi penyebab tingginya risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan di instalasi gawat darurat dan ruang perawatan intensif. Insiden infeksi terkait pelayanan kesehatan dapat dicegah dan dihindari melalui penerapan kepatuhan kewaspadaan standar. Namun, tingkat kepatuhan kewaspadaan standar pada perawat masih tergolong rendah. Perilaku kepatuhan kewaspadaan standar pada perawat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor demografi, predisposisi, pemungkin, dan penguat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan kewaspadaan standar pada perawat. Desain riset menggunakan deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini melibatkan 100 perawat ruang perawatan intensif dan IGD yang dipilih dengan menggunakan metode convenience sampling. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Nilai kepatuhan kewaspadaan standar perawat relatif cukup rendah yaitu sebesar 54.66 ($SD = 4.68$) atau sekitar 67.89 persen dari total nilai kepatuhan tertinggi. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa usia ($p = 0.939$), lama bekerja ($p = 0.564$), jenis kelamin ($p = 0.064$), tingkat pendidikan ($p = 0.870$), unit kerja ($p = 0.078$), jenjang karir ($p = 0.919$), pelatihan ($p = 0.065$), pengetahuan ($p = 0.137$), sikap ($p = 0.738$), ketersediaan fasilitas ($p = 0.810$), standar prosedur operasional ($p = 0.229$), dan dukungan atasan ($p = 0.436$) tidak memiliki hubungan yang bermakna. Hanya efikasi diri ($p = 0.009$) yang memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan kewaspadaan standar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efikasi diri merupakan faktor yang esensial untuk meningkatkan kepatuhan kewaspadaan standar. Hasil penelitian ini merekomendasikan rumah sakit untuk menyelenggarakan atau menggiatkan program atau aktivitas yang mampu meningkatkan efikasi diri perawat agar tingkat kepatuhan kewaspadaan standar perawat dapat meningkat.

.....The limited response time, decreased immune system, and many invasive procedures performed by nurses to the patient are responsible for the high risk of healthcare-associated infections (HAIs) in the emergency and intensive care units. The incidence of HAIs can be prevented and avoided through compliance on standard precautions. However, the level of nurses compliance on standard precautions is still low. The compliance on standar precautions can be influenced by several factors, such as demographic, predisposing, enabling, and reinforcing factors. This study aimed to identify factors affecting nurses compliance on standard precautions. This study used descriptive correlation with cross sectional approach. The study involved 100 intensive care and emergency care nurses who were selected using convenience sampling method. Data were collected using questionnaires. The study revealed that the mean score of nurses compliance on standard precaution was 54.66 ($SD = 4.68$) or 67.89 percent of the total correct score. The results of the study, furthermore, showed that there was no significant correlation between age ($p =$

0.939), working experience ($p = 0.564$), gender ($p = 0.064$), level of education ($p = 0.870$), working unit ($p = 0.078$), level of career ($p = 0.919$), training ($p = 0.065$), knowledge ($p = 0.137$), attitude ($p = 0.738$), facility ($p = 0.810$), standard operational procedure ($p = 0.229$), managerial support ($p = 0.436$) with standard precaution compliance. Only self-efficacy showed significant correlation with standard precaution compliance ($p = 0.009$). The study concluded that self- efficacy could increase nurses compliance on standard precautions. The results of the study recommended the hospitals conducting programs or activities that may enhance nurses efficacy, because it can improve nurses compliance on standar precautions.