

Persepsi estetik terhadap pasien fousenier gangrene yang telah dilakukan prosedur split thickness skin graft pada residen bedah plastik, pasien, dan pasangannya = Aesthetic perception of fousenier gangrene patient after split thickness skin graft procedure among plastic surgery residents, patients and their spouses using visual analog scale

Firtanty Tasya Andriami Syahputri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20499294&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Latar Belakang: Rekonstruksi pada pasien Fournier Gangrene membutuhkan hasil yang baik secara fungsi dan estetik karena dapat mempengaruhi kondisi psikologis pasien. Karena, penilaian penampilan estetik sangat subjektif, kami mengumpulkan data persepsi estetik pasien Fournier gangrene yang telah dilakukan prosedur STSG menggunakan Visual Analog Scale.

Tujuan: Mendapatkan data mengenai persepsi estetik terhadap pasien Fournier Gangrene

Metode: Residen bedah plastik, pasien Fournier gangrene dan pasangannya diberikan foto pasien Fournier gangrene yang telah menjalani prosedur STSG. Mereka memberikan nilai berdasarkan VAS. Kami menanyakan apakah ada keluhan tambahan pada pasien.

Hasil: Dari Januari 2011 hingga Agustus 2019, didapatkan 91 pasien Fournier gangrene di RSHS. Kami melakukan seleksi pada pasien menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi dan mendapatkan 11 pasien. Hampir semua pasien menyatakan bahwa hasil prosedur STSG secara estetik baik, mean 8,10 (SD 0,74). Sedangkan semua residen bedah plastik dan pasangan dari pasien memberikan nilai yang baik atas hasil operasi, mean 8,36 (SD 0,50) dan 8,22 (SD 0,62). Tidak ada pasien yang mengeluhkan keluhan tambahan setelah prosedur STSG.

Kesimpulan: Tiap kelompok penelitian memiliki latar belakang yang berbeda, namun didapatkan hasil persepsi estetik yang sama (baik) atas prosedur STSG tersebut.

<hr>

ABSTRACT

Background: Reconstruction of Fournier Gangrene patient is required functional and aesthetic appearance for psychological reasons. However, aesthetic perfection varies greatly and depends on subjective perception.

Methods: Plastic Surgery residents, Fournier gangrene patients and their spouses are given the photos of patients after STSG. They made score based on VAS. We also asked for any complaints after the procedure.

Aim: Provide database regarding aesthetic perception of Fournier gangrene patient after STSG.

Result: From January 2011 until August 2019, there is 91 founier gangrene patients at Hasan Sadikin hospital. We got 11 patients after selecting those using inclusion and exclusion criteria. Almost all patients claimed that the aesthetic result after STSG procedure were good, the mean value were 8,10 (SD 0,74).

While, all off the plastic surgery residents and the spouses of the patients argued that the aesthetic outcome of Fournier gangrene patients after STSG procedure were good. The mean value were 8,36 (SD 0,50) and 8,22 (SD 0,62). All of the patients didnt complaint any additional complaint.

Conclusion: While each subject group has different background, we got same aesthetic perception from all

groups (good result).