

# Analisis Efektivitas-Biaya Terapi Kombinasi Metformin-Insulin dan Metformin-Sulfonilurea pada Pasien Rawat Jalan dengan Diabetes Mellitus Tipe 2 di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo = Cost-Effectiveness Analysis of Metformin-Insulin and Metformin-Sulfonilurea Combination Therapy in Outpatients with Type 2 Diabetes Mellitus at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.

Fitriyani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20499818&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b><br>

Diabetes mellitus (DM) tipe 2 diketahui sebagai salah satu masalah kesehatan yang memberikan beban ekonomi yang cukup besar pada sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Bervariasinya penggunaan terapi obat akan mengakibatkan adanya perbedaan dalam efektivitas dan biaya terapi, sehingga perlu dilakukan analisis efektivitas-biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas-biaya terapi kombinasi metformin-insulin dan metformin-sulfonilurea pada pasien rawat jalan dengan DM tipe 2. Penelitian ini menggunakan desain studi kohort, pengambilan data dilakukan secara retrospektif di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo menggunakan rekam medik pasien rawat jalan dengan DM tipe 2 dari tahun 2016-2019 dan data billing rumah sakit. Efektivitas terapi ( $\text{HbA1c}$ ) dan biaya medis langsung antara kedua kelompok dibandingkan.  $\text{HbA1c}$  antara kelompok metformin-insulin dan kelompok metformin-sulfonilurea tidak memiliki perbedaan yang bermakna secara statistik (rerata perbedaan 0,123%;  $p=0,608$ ). Sedangkan median biaya medis langsung kelompok metformin-insulin lebih tinggi dibandingkan kelompok metformin-sulfonilurea ( $p < 0,001$ ). Hasil analisis efektivitas-biaya menunjukkan bahwa terapi kombinasi metformin-sulfonilurea lebih cost-effective dibandingkan kombinasi metformin-insulin.

<hr>

### <b>ABSTRACT</b><br>

Type 2 diabetes mellitus (DM) has been recognized as one of the health problems that imposes economic costs to health care systems around the world. Variation of drug therapy will result in differences in effectiveness and cost of therapy, thus cost-effectiveness analysis has been regarded paramount. The purpose of this study is to analyze the cost-effectiveness of metformin-insulin and metformin-sulfonilurea combination therapy in outpatients with type 2 DM. This cohort study was conducted retrospectively at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo using medical records of outpatients with type 2 DM from 2016-2019 and hospital billing. The effectiveness of therapy ( $\text{HbA1c}$ ) and direct medical costs between the two groups were compared.  $\text{HbA1c}$  between the metformin-insulin group and the metformin-sulfonilurea group did not have statistically significant differences (mean difference 0,123%;  $p=0,608$ ). While the median of direct medical costs of the metformin-insulin group was higher than metformin-sulfonilurea group ( $p < 0,001$ ). The results of the cost-effectiveness analysis showed that the combination therapy of metformin-sulfonilurea was more cost-effective compared to the combination of metformin-insulin.