

Hubungan dosis kumulatif deksametason dan risiko obesitas pada pasien leukemia limfoblastik akut anak pasca fase induksi = Cumulative dose of dexamethasone and post-induction phase risk of obesity in children with acute lymphoblastic leukemia

Jessica, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20500997&lokasi=lokal>

Abstrak

Obesitas adalah salah satu masalah kesehatan kronik yang dialami oleh sebagian besar survivor LLA. Deksametason digunakan dalam terapi LLA dan memiliki efek samping peningkatan berat badan sehingga diduga memiliki hubungan terhadap risiko obesitas pada anak dengan ALL yang mendapatkan terapi. Data penelitian diambil dari 149 subjek, 43 kasus dan 106 kontrol. Analisis Odds Ratio menunjukkan bahwa dosis kumulatif deksametason berhubungan dengan angka kejadian obesitas pada setiap kelompok dosis dengan nilai paling besar pada dosis 100-200 mg ($OR = 4,961$ CI = 1,812-13,536). Analisis multivariat menunjukkan bahwa stratifikasi risiko merupakan faktor risiko obesitas ($OR = 7,839$ CI = 2,559-24,009), sedangkan usia merupakan faktor protektif ($OR = 0,041$ CI = 0,008-0,220).

.....

Obesity is one of chronic health conditions that affect a majority of ALL survivors. Corticosteroid is used in the treatment of ALL and has the side effect of weight gain. Hence, the usage of corticosteroid in the treatment of ALL is suspected to be the cause of obesity in ALL survivors. The study was done on 149 subjects, consisted of 43 cases and 106 controls. Odds ratio analysis shows correlation between high corticosteroid dose and obesity in all dose ranges with highest value at 100-200 mg range ($OR = 4,961$ CI = 1,812-13,536). Multivariate analysis shows that risk stratification is a risk factor for obesity ($OR = 7,839$ CI = 2,559-24,009) whereas age is protective for obesity ($OR = 0,041$ CI = 0,008-0,220).