

# **Analisis Faktor Risiko Pekerjaan dan Psikososial dengan Keluhan Low Back Pain dan Neck Pain Pada Pekerja Kantoran Pengguna Komputer atau Laptop di PT X Tahun 2020 = Association of Occupational and Psychosocial Risk Factors to Low Back Pain and Neck Pain Complaints on Computer or Laptop Use Officer at PT X in 2020**

Aqua Da Mongga, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20506045&lokasi=lokal>

---

## **Abstrak**

Kebanyakan dari pekerjaan-pekerjaan yang melakukan aktivitas dalam keadaan duduk dapat terpapar pada tingkat waktu menetap yang tinggi, salah satunya adalah pada pekerja di kantor pengguna komputer atau laptop. Penggunaan dan pemakaian komputer tau laptop dalam kurun waktu cukup lama dapat meningkatkan risiko keluhan gangguan pada musculoskeletal, terkhusus pada bagian punggung bawah dan leher. Untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi keluhan low back pain dan neck pain pada pekerja kantoran pengguna komputer dilakukan penelitian studi dengan menggunakan data primer tahun 2020. Penelitian melibatkan 55 pekerja PT X di daerah Jakarta Timur. Ditemukan pekerja yang memiliki keluhan gangguan low back pain sebesar 41.8% dan pekerja yang memiliki keluhan pada gangguan neck pain sebesar 50.9%. Pada analisis hubungan faktor risiko pekerjaan dengan keluhan gangguan low back pain yang menggunakan chi-square didapatkan bahwa antara faktor risiko pekerjaan dan psikososial memiliki hubungan signifikan dengan keluhan gangguan low back pain yaitu kerja otot statis ( $p\text{-value}=0.03$ ), tuntutan kerja ( $p\text{-value}=0.00$ ), dukungan sosial ( $p\text{-value}=0.00$ ), dan stres kerja ( $p\text{-value}=0.00$ ). Kemudian pada analisis hubungan faktor risiko pekerjaan dengan keluhan gangguan neck pain yang menggunakan chi-square didapatkan bahwa antara faktor risiko pekerjaan dan psikososial memiliki hubungan signifikan dengan keluhan gangguan low back pain yaitu durasi penggunaan komputer.laptop ( $p\text{-value}=0.01$ ), kerja otot statis ( $p\text{-value}=0.01$ ), tuntutan kerja ( $p\text{-value}=0.02$ ), dukungan sosial ( $p\text{-value}=0.04$ ), dan stres kerja ( $p\text{-value}=0.01$ ). Kata kunci: low back pain; neck pain; pengguna komputer; pekerja kantor.

<hr>

Most of the tasks with prolonged sitting can be exposed to high levels of sedentary behavior, one of which is computer or laptop user workers in the office. A long period time of computer or laptop use can increase the risk of musculoskeletal disorders complaints, especially in the lower back and neck. To look at the factors that influence complaints of low back pain and neck pain in office workers, a cross-sectional study using 2020 primary data. The study involved 55 PT X workers in East Jakarta. There were 41.8% workers who had low back pain complaints and 50.9% workers who had neck pain complaints. The result of chi-square analysis indicated that there were significant relationship between physical and psychosocial risk factors with low back pain complaints, those are static muscle work ( $p\text{-value} = 0.03$ ), work demands ( $p\text{-value} = 0.00$ ), social support ( $p\text{-value} = 0.00$ ), and work stress ( $p\text{-value} = 0.00$ ). Then, the result of chi-square analysis indicated that there were significant relationship between physical and psychosocial risk factors with neck pain complaints, those are duration of computer use ( $p\text{-value} = 0.01$ ), work static muscle ( $p\text{-value} = 0.01$ ), work demands ( $p\text{-value} = 0.02$ ), social support ( $p\text{-value} = 0.04$ ), and work stress ( $p\text{-value} = 0.01$ ).