

Perilaku Mencari Pertolongan Kesehatan pada Ibu Hamil Pre-eklampsia Berat dan Faktor yang Berkontribusi = Maternal Health Seeking Behavior of Severe Pre-eclampsia and Contributing Factors.

Neny Utami, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20506996&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perilaku mencari pertolongan kesehatan pada ibu hamil memiliki peran yang penting dalam pencegahan komplikasi kehamilan yang berisiko. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi perilaku mencari pertolongan kesehatan pada ibu hamil pre-eklampsia berat dan faktor yang berkontribusi. Metode penelitian adalah cross sectional dengan convenience sampling pada pengambilan sampel. Responden berjumlah 217 yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pelayanan (nilai $p=0,049$), pengambilan keputusan (nilai $p=0,001$) dan tingkat pengetahuan tanda dan bahaya kehamilan (nilai $p=0,001$) berkontribusi pada perilaku mencari pertolongan kesehatan pada ibu hamil pre-eklampsia berat. Faktor yang paling dominan berkontribusi pada perilaku mencari pertolongan kesehatan pada ibu hamil pre-eklampsia berat menunjukkan bahwa pengambilan keputusan $OR=2,741(95\% CI; 1,49-5,02)$ dan tingkat pengetahuan tanda dan bahaya kehamilan $OR=0,25 (95\% CI; 0,13-0,48)$. Tenaga kesehatan diharapkan mampu meningkatkan edukasi tentang pengambilan keputusan dalam pemanfaatan layanan kesehatan pada masa kehamilan.

<hr>

ABSTRACT

Maternal health seeking behavior has an important role in the prevention of high risk pregnancy complications. The purpose of this study is to identified the maternal health seeking behaviour with severe pre-eclampsia and contributing factors. The research method is cross sectional with convenience sampling. There were 217 respondents who met the inclusion criteria. The results of this study indicate that service satisfaction(p value = $0,049$), decision making (p value = $0,001$) and the level of knowledge of signs and dangers of pregnancy (p value = $0,001$) are factors that contribute to the maternal health seeking behaviour with severe pre-eclampsia. The dominant factors influencing the maternal health seeking behavior with severe pre-eclampsia were decision making $OR=2,741(95\% CI; 1,49-5,02)$ and the level of knowledge of signs and dangers of pregnancy $OR=0,25 (95\% CI; 0,13-0,48)$. Health workers are expected to be able to increase education about decision making in utilizing health services during pregnancy.