

# Angka Kesintasan Karsinoma Sel Skuamosa Rongga Mulut di RS Cipto Mangunkusumo = Survival Rate of Oral Squamous Cell Carcinoma in Cipto Mangunkusumo Hospital

Shabrina Rizky Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20511249&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

<p><strong>Pendahuluan: </strong>Karsinoma rongga mulut adalah keganasan tersering ke-6 di Asia. Mayoritas pasien karsinoma sel skuamosa rongga mulut (KSSRM) di RSCM datang dalam kondisi lanjut. Namun belum ada studi yang meneliti mengenai kesintasan penyakit ini di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesintasan KSSRM di RSCM berdasarkan stadium klinis AJCC ke-8.</p><p><strong>Metode: </strong>dilakukan studi analisis kesintasan secara retrospektif dengan menggunakan data pasien KSSRM yang didiagnosis di Divisi Bedah Onkologi RSCM pada tahun 2014-2018. Luaran pasien didapatkan dari rekam medis dan menghubungi pasien via telepon. Data dianalisis menggunakan metode Kaplan-Meier.</p><p><strong>Hasil: </strong>Mayoritas pasien adalah laki-laki (perbandingan laki-laki:perempuan adalah 1,03:1) dengan rerata usia  $51,12 \pm 13,821$  tahun. Tumor ditemukan paling banyak di daerah lidah (72,8%) dan kebanyakan pasien didiagnosis pertama kali pada stadium IV (83,4%). Kesintasan keseluruhan satu dan dua tahun adalah 58,6% dan 43,1%, dengan kesintasan spesifik-penyakit adalah 66,9%. Kesintasan satu dan dua tahun terendah adalah pada kelompok stadium IV (53,5% dan 36,1% secara berurutan). Namun tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kesintasan dan stadium klinis pada studi ini.</p><p><strong>Simpulan: </strong>Kesintasan KSSRM yang rendah di RSCM menunjukkan tingginya <em>patient delay</em>. Penapisan dan edukasi mengenai penyakit ini dibutuhkan untuk meningkatkan angka kesintasan.</p><p></p><hr /><p><strong>Introduction:</strong> Oral cancer carcinoma is the 6<sup>th</sup> most frequent malignancy in Asia. In Cipto Mangunkusumo Hospital, most patient comes in late stage. Yet, there is no survival study available for this disease in our country.</p><p><strong>Objectives:</strong> This study aims on revealing the survival rate oral squamous cell carcinoma (OSCC) patients in Cipto Mangunkusumo based on the 8<sup>th</sup> AJCC staging.</p><p><strong>Methods:</strong> We performed a retrospective survival analysis study from a database of OSCC patients diagnosed at Cipto Mangunkusumo Hospital in 2014-2018. Follow-up details were updated from medical record and by phone calls. Data was analysed using the Kaplan-Meier method.</p><p><strong>Results:</strong> Majority of the patients were male (male-to-female ratio was 1.03:1) with the mean age was  $51,12 \pm 13,821$  years old. Tumors occurred mostly in the tongue (72,8%), and most patients were initially diagnosed as stage IV (83,4%). The one and two year overall survival rate were 58,6% and 43,1%, with a disease-specific survival rate was 66,9%. The worst one and two year survival rate was found constantly in the stage IV group (53,5% and 36,1%, consecutively). Though there was no statistically significant association between overall survival and clinical staging in this study ( $p>0,05$ ).</p><p><strong>Conclusion:</strong> The low OSCC survival rate in Cipto Mangunkusumo Hospital indicated a high level of patient delay. Screening and education regarding this disease are needed to increase the survival rate.</p>