

# Faktor-faktor risiko dan protektif kecenderungan penggunaan kembali pasien penyalahguna narkotika di Balai Besar Rehabilitasi BNN = Risk and protective factors tendency to re-use of narcotics abusing patients at The Balai Besar Rehabilitasi BNN.

Dipa Tri Adhitya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20518187&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Pemulihan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya faktor risiko yang lebih dominan dibandingkan faktor protektif dari pasien penyalahguna sehingga pasien penyalahguna memiliki kecenderungan menggunakan kembali, faktor risiko dan protektif tersebut dapat berasal dari dalam diri pasien, keluarga dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD). Dan tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisa faktor-faktor risiko dan protektif kecenderungan penggunaan kembali pasien penyalahguna narkotika. Hasil Penelitian didapatkan faktor risiko dari external yang banyak dialami oleh informan adalah faktor lingkungan yaitu pengaruh teman yang menggunakan narkotika, ketersediaan narkotika di lingkungan informan, konflik dalam keluarga, pola komunikasi negatif, pengawasan orang tua lemah, ikatan sosial yang rendah. Sedangkan faktor risiko dari internal individu diantaranya: faktor dari fisiologis individu, koping individu yang buruk, kontrol impuls yang buruk dan pengaruh kepribadian. Faktor protektif internal diantaranya: Persepsi individu yang positif, motivasi/ keinginan pulih, dan religiusitas individu. Dan faktor eksternal individu didapatkan yaitu adanya dukungan keluarga, adanya ikatan antar anggota keluarga, dan komunitas di lingkungan yang positif.

.....Recovery does not go as expected due to risk factors that are more dominant than protective factors from narcotics abusing patients so that have a tendency to reuse, These risk and protective factors can come from within the patient, family and environment. This study uses a qualitative design that uses in-depth interviews and focus group discussion (FGD). And the purpose of this study is to analyze the risk factors and protective factors of drug re-use. The results showed that the external risk factors found were environmental factors, namely the influence of friends who used narcotics, the availability of narcotics in the informant's environment, conflicts in the family, negative communication patterns, weak parental supervision, low social ties. While the internal risk factors of the individual include: individual physiological factors, poor individual coping, poor impulse control and personality influences. Internal protective factors include: Positive individual perceptions, motivation/desire to recover, and individual religiosity. And individual external factors were obtained, namely the

existence of family support, the existence of bonds between family members, and the community in a positive environment.