

# Analisis Biofiksasi CO<sub>2</sub> Pada Mikrolaga Synechococcus HS-9 dengan Variasi Konsentrasi CO<sub>2</sub> pada Rectangular Airlift Photobioreactor = Analysis of CO<sub>2</sub> Biofixation in Synechococcus HS-9 Microalgae with Variations in CO<sub>2</sub> Concentration in Rectangular Airlift Photobioreactor

Muhammad Balya Haidar, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20526529&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Penelitian mengenai analisis biofiksasi CO<sub>2</sub> (cyanobacteria) Synechococcus HS-9 dengan variasi konsentrasi CO<sub>2</sub> pada rectangular airlift Photobioreactor telah dilakukan. Synechococcus HS-9 merupakan cyanobacteria hasil isolasi dari sumber air panas di wilayah Rawa Danau, Banten yang merupakan koleksi dari Laboratorium Taksonomi Tumbuhan Departemen Biologi FMIPA UI, Depok. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan Synechococcus HS-9 setelah diberikan CO<sub>2</sub> dengan konsentrasi tertentu serta konsentrasi CO<sub>2</sub> optimal untuk pertumbuhan Synechococcus HS-9. Synechococcus HS-9 ditumbuhkan dalam sistem rectangular airlift photobioreactor pada kecepatan aerasi 2 LPM dengan variasi CO<sub>2</sub> sebesar 1,5%; 3%; 5%; serta tanpa tambahan CO<sub>2</sub>. Data yang diamati pada penelitian adalah biofiksasi CO<sub>2</sub>, pertumbuhan Synechococcus HS-9, serta kondisi lingkungan pertumbuhan Synechococcus HS-9. Hasil pengamatan biofiksasi CO<sub>2</sub> menunjukkan nilai -bio-fixation rate dari Synechococcus HS-9 adalah 4,48 g/L/d dan nilai CO<sub>2</sub> removal efficiency sebesar 83,4% pada tambahan CO<sub>2</sub> sebesar 5%. Hasil pengamatan pertumbuhan Synechococcus HS-9 menunjukkan variasi tambahan CO<sub>2</sub> sebesar 3% menghasilkan pertumbuhan paling optimal, hal tersebut dilihat dari jumlah produksi biomassa kering yang paling besar, yaitu 3,022 gram. Kondisi lingkungan pertumbuhan Synechococcus HS-9 juga mengalami perubahan, terutama pada nilai pH lingkungan. Penambahan CO<sub>2</sub> pada kultivasi Synechococcus HS-9 menyebabkan turunnya nilai pH dibandingkan dengan kultivasi Synechococcus HS-9 yang tidak diberikan tambahan CO<sub>2</sub>. Hasil penelitian menunjukkan penambahan CO<sub>2</sub> mempengaruhi pertumbuhan Synechococcus HS-9. Konsentrasi optimal CO<sub>2</sub> untuk pertumbuhan Synechococcus HS-9 adalah 3%, sedangkan untuk biofiksasi CO<sub>2</sub> adalah 5%.

.....Research on the analysis of biofixation Synechococcus HS-9 with variations in CO<sub>2</sub> concentration in a rectangular airlift photobioreactor has been carried out. Synechococcus HS-9 is cyanobacteria isolated from hot springs in the Rawa Danau area, Banten, which is a collection of the Plant Taxonomy Laboratory, Department of Biology, FMIPA UI, Depok. This study aims to determine the growth of Synechococcus HS-9 after being given CO<sub>2</sub> with a certain concentration and what is the optimal concentration of CO<sub>2</sub> for the growth of Synechococcus HS-9. Synechococcus HS-9 was grown in a rectangular airlift photobioreactor system at aeration speed of 2 LPM with CO<sub>2</sub> variations of 1,5%; 3%; 5%; and without additional CO<sub>2</sub>. The data observed in this study were the biofixation of CO<sub>2</sub>, the growth of Synechococcus HS-9, and environmental conditions for the growth of Synechococcus HS-9. The results of CO<sub>2</sub> biofixation observations showed that the bio-fixation rate of Synechococcus HS-9 was 4.48 g/L/d and the value of CO<sub>2</sub> removal efficiency was 83.4% with the addition of 5% CO<sub>2</sub>. The results of the observation of the growth of Synechococcus HS-9 showed an additional variation of 3% CO<sub>2</sub> resulted in the most optimal growth, this was seen from the largest amount of dry biomass production, which was 3.022 grams. The environmental conditions for the growth of Synechococcus HS-9 also changed, especially in the pH value of the

environment. The addition of CO<sub>2</sub> to the cultivation of *Synechococcus* HS-9 caused a decrease in the pH value compared to the cultivation of *Synechococcus* HS-9 which was not given additional CO<sub>2</sub>. The results showed that the addition of CO<sub>2</sub> affected the growth of *Synechococcus* HS-9. The optimal CO<sub>2</sub> concentration for *Synechococcus* HS-9 growth was 3%, while for CO<sub>2</sub> biofixation was 5%.