

Sebaran Vertical Nudibranchia (Mollusca: Gastropoda) di Terumbu Karang-Karang Lebar, Pulau Semak Daun Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dan Catatan Pertama (First Record) Pengamatan Pemangsaan Phyllidia Varicosa Lamarck, 1801 terhadap Sponge Axinyssa Cf. Aculeaia Wilson 1925

Yasman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=76322&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian mengenai Nudibranchia di terumbu karang Pulau Pramuka dan Karang Lebar, Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu telah dilakukan pada bulan November dan Desember 2000 serta bulan Januari 2001. Sebanyak 18 jenis Nudibranchia (4 Suku) ditemukan tersebar pada kedalaman 20-80 kaki (6-25 meter). Jenis-jenis dari suku Phyllidiidae (13 jenis) merupakan jenis yang paling sering dijumpai dan paling banyak jumlah individunya serta tersebar di berbagai kedalaman. Secara umum, jenis jenis Nudibranchia paling banyak dijumpai di kedalaman 50-60 kaki. Jumlah jenis Nudibranchia yang ditemukan akan menurun pada kedalaman yang kurang (20-40 kaki) dan lebih (70-80 kaki) dari 50-60 kaki. Pengamatan pemangsaan salah satu jenis Nudibranchia memberikan hasil catatan pertama (first record) pemangsaan Phyllidia varicosa terhadap sponge Axinyssa cf. aculeata. Teramatinya bekas pemangsaan pada sponge juga merupakan catatan pertama (first record).