

## Memasyarakatkan imunisasi dalam rangka penurunan mortalitas bayi dan anak

Achmad Djohari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=76456&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Kematian bayi dan anak di Indonesia masih tinggi. Sekitar 25% dari bayi yang lahir meninggal sebelum mencapai ulang tahunnya yang kelima. Angka ini di negara-negara yang sudah maju hanya sekitar 4% (Mosley, 1984). Hasil Survei Kesehatan Rumah tangga tahun 1980 yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan R.I. menunjukkan bahwa 45% dari seluruh kematian merupakan kematian bayi dan balita; dari kematian balita, 61% merupakan kematian bayi (Budiarso, 1983).

Salah satu penyebab kematian yang terpenting pada balita adalah tetanus neonatoruin (20,2%), yang dapat dicegah dengan imunisasi. Di samping itu ada penyakit-penyakit menular lain yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu campak, difteridan pertusis yang dapat mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut termasuk radang paru-paru,yang menyebabkan22,1% kematian balita. Dengan demikian jelas bahwa keberhasilan pelaksanaan imunisasi dalam masyarakat berkontribusi cukup penting dalam penurunan mortalitas bayi dan anak.

Imunisasi yang terorganisasi telah dilakukan sejak sebelum Perang Dunia II, yaitu imunisasi terhadap pencegahan ca-car. Pada tahun 1952 telah dicoba vaksinasi gabungan cacar/PCG. Pada tahun 1976 mulai dikembangkan imunisasi DPT untuk mencegah penyakit difteria, pertusis dan tetanus. Pada tahun 1977 dan 1978 mulai dipersiapkan pelaksanaan Pengembangan Program Imunisasi (PPI). Pada tahun 1980 mulai dikembangkan pemberian antigen campak dan polio secara terbatas.

Penilaian baik secara rutin ataupun dengan penelitian khusus terhadap pelaksanaan imunisasi telah dilakukan. Hasilnya adalah bahwa cakupan imunisasi masih rendah dan ketidak sinambungannya masih tinggi. Hal ini mungkin disebabkan antara?