

Hubungan Stigma, Citra Diri, Gangguan Depresi, Risiko Bunuh Diri dan Mekanisme Koping terhadap Kualitas Hidup Pasien dengan HIV/AIDS di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo = Quality of Life in HIV/AIDS Patient in Cipto Mangunkusumo Hospital and Its Relationship with Stigma, Self-esteem, Depression, Suicidality, and Coping Mechanism

Achmad Samjunanto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920528141&lokasi=lokal>

Abstrak

Latar Belakang: Infeksi HIV/AIDS merupakan penyakit yang kronis dan tidak dapat disembuhkan namun gejalanya masih dapat dikendalikan. Oleh karena itu, kualitas hidup menjadi luaran terapi yang penting untuk diperhatikan. Berbagai faktor psikososial seperti stigma, citra diri, gangguan depresi, risiko bunuh diri dan mekanisme coping merupakan faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien dengan HIV/AIDS dan dapat diintervensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stigma, citra diri, gangguan depresi, risiko bunuh diri dan mekanisme coping terhadap kualitas hidup pasien dengan HIV/AIDS.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain potong lintang. Subjek penelitian diambil dengan menggunakan consecutive sampling pada pasien dewasa yang berobat di poliklinik khusus HIV/AIDS di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada bulan Juni 2023. Instrumen swaperiksa digunakan untuk menilai variabel kualitas hidup (WHOQOL-Bref), stigma (Berger HIV Stigma Scale), mekanisme coping (Brief-COPE) dan citra diri (RSES). Wawancara semi terstruktur juga dilakukan untuk menilai gangguan depresi (MINI-ICD) dan risiko bunuh diri (CSSRS). Analisis regresi liner multipel digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan luaran kualitas hidup.

Hasil: Dari 207 subjek penelitian yang diteliti, didapatkan hubungan yang bermakna antara stigma diri dengan kualitas hidup pada ranah kesehatan fisik ($B:-0.15$; $IK95%: -0.23\text{--} -0.07$), hubungan sosial ($B:-0.19$, $IK95%:0.27\text{--} -0.10$) dan lingkungan ($B:-0.12$; $IK95% -0.20\text{--} -0.04$). Didapatkan hubungan yang bermakna antara citra diri dengan kualitas hidup pada ranah kesehatan fisik ($B:1.12$; $IK95%:0.71\text{--} 1.67$), psikologis ($B:1.73$; $IK95%:1.21\text{--} 2.26$), hubungan sosial ($B:0.91$, $IK95%:0.35\text{--} 1.46$) dan lingkungan ($B:1.27$; $IK95%:0.77\text{--} 1.77$). Didapatkan hubungan yang bermakna antara gangguan depresi dengan kualitas hidup pada ranah kesehatan fisik ($B:-4.59$; $IK95%:-7.41\text{--} -1.77$), psikologis ($B:-5.64$; $IK95%:-8.72\text{--} -2.56$), dan hubungan sosial ($B:-4.92$, $IK95%:-8.17\text{--} -1.66$). Didapatkan hubungan yang bermakna antara mekanisme coping dengan kualitas hidup pada ranah kesehatan fisik ($B:5.97$; $IK95%:1.71\text{--} 10.24$), psikologis ($B:9.65$; $IK95%:4.99\text{--} 14.31$), hubungan sosial ($B:12.99$, $IK95%:8.07\text{--} 17.91$) dan lingkungan ($B:10.79$; $IK95%:6.39\text{--} 15.18$) Koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 43.5-54.4%.

Simpulan: Terdapat hubungan antara stigma, gangguan depresi, risiko bunuh diri, citra diri dan mekanisme coping terhadap tiap ranah kualitas hidup pada pasien dengan HIV/AIDS. Citra diri dan mekanisme coping yang berfokus pada masalah menjadi faktor protektif sedangkan stigma dan gangguan depresi menjadi faktor risiko.

.....Background: HIS/AIDS is a chronic incurable yet controllable diseases. Thus, quality of life is a pivotal clinical outcome that must be evaluated other than its morbidity and mortality. Some psychosocial factors,

such as stigma, self-esteem, depressive disorder, suicidality, and coping mechanism, are prominent indicators that affect quality of life and could be intervened. This study aim to elaborate the relationship of stigma, self-esteem, depressive disorder, suicidality, and coping mechanism to the quality of life in patient with HIV/AIDS.

Method: A cross-sectional study was conducted in June 2023 in outpatient HIV/AIDS clinic in Cipto Mangunkusumo Hospital. Consecutive sampling was used in adult patients. Self rating instrument was used to measure quality of life (WHOQOL-Bref), stigma (Berger HIV Stigma Scale), coping mechanism (Brief-COP) and self esteem (RSES). Semi-structured interview was used to assess depressive disorder (MINI-ICD) and suicide risk (CSSRS). Multiple linear regression was used to explore the relationship between the independent variables and quality of life.

Results: There are 207 respondents in this study. The results showed significant relationship between stigma and quality of life in physical health ($B:-0.15$; $CI95\%:-0.23 - -0.07$), social relationship ($B:-0.19$, $CI95\%:0.27 - -0.10$) and environment domains ($B:-0.12$; $CI95\% -0.20 - -0.04$) There was a significant relationship between self esteem and quality of life in physical health domain ($B:1.12$; $CI95\%:0.71 - 1.67$), psychological ($B:1.73$; $CI95\%:1.21 - 2.26$), social relationship ($B:0.91$, $CI95\%:0.35 - 1.46$) and environment domains ($B:1.27$; $CI95\%:0.77 - 1.77$). Significant relationships were found between depressive disorder and quality of life in physical health domain ($B:-4.59$; $CI95\%:-7.41 - -1.77$), ($B:-5.64$; $CI95\%:-8.72 - -2.56$), and social relationship domains ($B:-4.92$, $CI95\%:-8.17 - -1.66$). There was a significant relationship between coping mechanism and quality of life in physical health domain ($B:5.97$; $CI95\%:1.71 - 10.24$), psychological ($B:9.65$; $CI95\%:4.99 - 14.31$), social relationship ($B:12.99$, $CI95\%:8.07 - 17.91$) and environment domains ($B:10.79$; $CI95\%:6.39 - 15.18$). The determinant coefficient in this study were 43.5-54.4%.

Conclusion: There is relationship relationship of stigma, self-esteem, depressive disorder, suicidality, and coping mechanism with the quality of life in patient with HIV/AIDS in each domains. Stigma and depressive disorder are risk factors while self-esteem and problem focused coping mechanism are the protective factors.