

# Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Underweight pada Balita di Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak pada Tahun 2020 = Factors Related to Underweight in Children Under Five in Karangkamulyan Village, Cihara District, Lebak Regency in 2020

Raisha Azizahra Syafruddin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920539751&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Underweight atau berat badan kurang adalah berat badan yang terlalu rendah untuk anak normal yang sehat<sup>1</sup>. Underweight masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia. Prevalensi underweight di Kabupaten Lebak tahun 2018, mencapai angka 18.61% dimana angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional (17.7%) dan Provinsi Banten (16.22%). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian underweight pada balita di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional yang dilakukan dengan menggunakan data primer dari penelitian “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecacingan pada Balita di Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Tahun 2020”. Sampel penelitian ini adalah 208 balita usia 24-59 bulan di Desa Karangkamulyan. Analisis data univariat dan bivariat berupa uji Chi-square dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa balita usia 24-59 bulan di Desa Karangkamulyan mengalami kejadian underweight sebanyak 10.6%. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang berhubungan secara signifikan dengan kejadian underweight pada balita, diantaranya: usia balita ( $p$ -value =0,000), riwayat penyakit ISPA ( $p$ -value =0,003), asupan protein ( $p$ -value =0,044), dan kebiasaan konsumsi protein nabati ( $p$ -value =0,006).

.....Underweight is a body weight that is too low for a normal healthy child<sup>1</sup>. Being underweight is still a significant health problem in Indonesia. The prevalence of underweight in Lebak Regency in 2018, reached 18.61%, which is higher than the national prevalence rate (17.7%) and Banten Province (16.22%). 2. This study aimed to determine the factors associated with the incidence of underweight in children under five in Karangkamulyan Village, Cihara District, Lebak Regency in 2020. This study used a cross-sectional design which was carried out by analyzing primary data from the study “Factors that Related to the Incidence of Helminthiasis in Toddlers in Karangkamulyan Village, Cihara District, Lebak Sub-district in 2020”. The sample of this study was 208 children aged 24-59 months in Karangkamulyan Village. Univariate and bivariate data analysis was conducted by using SPSS version 22 application. Study results showed that 10.6% of children of Karangkamulyan Village have an incidence of underweight. Also, this study showed that four variables were significantly associated with the age of children ( $p$ -value =0,000), history of upper respiratory tract infection ( $p$ -value =0,003), protein intake ( $p$ -value =0,044), and plant protein ( $p$ -value =0,006).