

Pengaruh Tindakan Keperawatan Ners, Latihan Asertif, dan Psikoedukasi Keluarga terhadap Pencegahan Kekambuhan pada Pasien Perilaku Kekerasan = The Effects of Standard Nursing Intervention, Assertive Training, and Family Psychoeducation on Preventing The Risk Factors of Relapse among Client with Violent Behaviour

Yunita Anggraini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920548420&lokasi=lokal>

Abstrak

Pendahuluan: Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang terjadi pada fungsi otak. Prevalensi skizofrenia mencapai dua puluh empat juta di seluruh dunia dan sering terjadi pada usia remaja akhir. Prevalensi skizofrenia mengalami peningkatan sebanyak 0,18% di Indonesia sedangkan di Provinsi Bali skizofrenia menempati urutan pertama. Tanda dan gejala skizofrenia dapat berupa perilaku kekerasan. Sebanyak 68 % pasien skizofrenia dilakukan perawatan kembali (rehospitalisasi) di rumah sakit karena perilaku kekerasan. Dampak kekambuhan yang dikarenakan oleh perilaku kekerasan adalah memburuknya gejala, menurunnya fungsi kognitif, resistensi terhadap pengobatan dan sulit diterima kembali di masyarakat. Maka dari itu diperlukan tindakan untuk mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien dengan perilaku kekerasan.

Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh tindakan keperawatan ners, latihan asertif, dan psikoedukasi keluarga terhadap kemampuan mencegah kekambuhan pada pasien dengan perilaku kekerasan.

Metode : Menggunakan desain penelitian Quasy experiment dengan rancangan pre-post test with control group yang dianalisis menggunakan univariat dan bivariat.

Hasil: Penelitian menunjukkan penurunan tanda dan gejala perilaku kekerasan, peningkatan kemampuan pasien mengendalikan perilaku kekerasan, peningkatan kemampuan berperilaku asertif, peningkatan kepatuhan minum obat, dan peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat pasien dengan perilaku kekerasan. Rekomendasi: tindakan keperawatan ners, latihan asertif, dan psikoedukasi keluarga direkomendasikan sebagai upaya untuk mencegah kekambuhan pada pasien.

.....Background: Schizophrenia is a mental disorder that occurs in brain function. The prevalence of schizophrenia reaches twenty-four million worldwide and often occurs in late adolescence. The prevalence of schizophrenia has increased by 0.18% in Indonesia while in Bali Province schizophrenia ranks first. Signs and symptoms of schizophrenia can include violent behavior. As many as 68% of schizophrenia patients are rehospitalized in the hospital due to violent behavior. The impact of relapse caused by violent behavior is worsening symptoms, decreased cognitive function, resistance to treatment and difficulty being accepted back in society. Therefore, measures are needed to prevent relapse in patients with violent behavior.

Objective: To determine the effect of nursing actions, assertive training, and family psychoeducation on the ability to prevent relapse in patients with violent behavior.

Methods: Using Quasy experiment research design with pre-post test design with control group which was analyzed using univariate and bivariate.

Results: The study showed a decrease in signs and symptoms of violent behavior, an increase in the patient's ability to control violent behavior, an increase in the ability to behave assertively, an increase in medication compliance, and an increase in the family's ability to care for patients with violent behavior.

Recommendations: nursing actions, assertive practice, and family psychoeducation are recommended as an

effort to prevent relapse in patients.