

Determinan Kesiapan Perawat Dalam Menjalankan Metode Asuhan Keperawatan Primer di Ruang Rawat Inap = Determinant of Nurses' Readiness in Carrying Out Primary Nursing Care Methods in the Inpatient Room

Arni Sunarti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920548891&lokasi=lokal>

Abstrak

Kesiapan perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan yang optimal akan memberikan keberhasilan pelayanan di rumah sakit. Pentingnya asuhan keperawatan primer di rumah sakit sebagai metode yang mampu meningkatkan partisipasi perawat dalam menjalankan tugas. Metode keperawatan primer ini memiliki keunggulan dalam menjadikan perawatan pasien lebih humanis dan care dibandingkan asuhan keperawatan lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi determinan kesiapan perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan primer di ruang rawat inap. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional pada 112 perawat di ruang rawat inap. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik usia responden, lama kerja dan level PK tidak ada hubungan dengan pelaksanaan asuhan keperawatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan kesiapan perawat diantaranya motivasi, pengetahuan, keterampilan kompetensi, dan organisasi memiliki hubungan yang bermakna terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan primer ($p < 0.05$), aktor yang paling besar adalah motivasi perawat (2.568). Penelitian ini merekomendasikan dukungan manajemen dalam meningkatkan motivasi perawat primer sebagai determinan penentu kesiapan perawat dalam menjalankan metode asuhan keperawatan primer di ruang rawat inap dengan harapan dapat meningkatkan dedikasi, keterlibatan, dan ketangguhan mereka dalam melaksanakan asuhan keperawatan di ruang rawat inap.

.....Readiness of nurses to carry out optimal nursing care give result in successful service in the hospital. The importance of primary nursing care in hospitals as a method that can increase nurse participation in carrying out their duties. This primary nursing method has the advantage of making patient care more humane and caring compared to other nursing care methods. The aim of this research is to identify the determinants of nurses' readiness in carrying out primary nursing care in the inpatient room. The research method used a quantitative approach with a cross-sectional research design on 112 nurses in inpatient rooms. The research results showed that the characteristic of respondents age, length or work and competence level were not related to the implementation of nursing care. The research results showed that the determinants of nurses readiness, including motivation, knowldge, skills, competence, and organization, had a significant relationship with the implementation of primary nursing care ($p < 0.05$), the most important factor is nurse motivation. This research recommends management support in increasing the motivation of primary nurses as a determinant of nurses readiness to carry out primary nursing care methods in patient ward wwith the hope of increasing their dedication, involvement and resilience in carrying out nursing care in the patient ward.