

Penerapan Aktivitas Terjadual Dengan Terapi Okupasi Waktu Luang pada Pasien Gangguan Sensori Persepsi: Halusinasi Pendengaran = Application of Scheduled Activities With Leisure Occupational Therapy in Patients with Sensory Perception Disorders: Auditory Hallucinations

Lilis Komalasari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920558804&lokasi=lokal>

Abstrak

Halusinasi merupakan sebuah persepsi sensorik tanpa adanya stimulus eksternal yang dapat melibatkan modalitas sensorik. Halusinasi pendengaran merupakan gejala yang paling sering muncul pada pasien dengan skizofrenia yaitu sekitar 59%. Dampak pada individu dengan halusinasi pendengaran diantaranya merasa tertekan oleh sifat suara yang mengganggu, menjadi marah, depresi, tidak dapat mengikuti aktivitas sehari-hari, kualitas hidup berkurang, harga diri rendah, dan fungsi sosial dan emosional yang buruk. Penulisan karya ilmiah akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aktivitas terjadual dengan terapi okupasi waktu luang pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi pendengaran terhadap penurunan gejala halusinasi pendengaran. Intervensi keperawatan yang dilakukan dengan penerapan kegiatan terjadual dengan terapi okupasi waktu luang yaitu merangkai bunga. Penerapan intervensi kegiatan terjadual dengan terapi okupasi waktu luang pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi pendengaran dapat menurunkan gejala halusinasi, terlihat dari hasil hallucination rating scale pada pasien yang mendapatkan hasil 8 saat pelaksanaan intervensi kegiatan terjadual dan setelah dilakukan kegiatan terjadual dengan terapi okupasi waktu luang mendapatkan hasil 1. Karya ilmiah ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas perawat untuk menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi pendengaran, terutama pelaksanaan kegiatan terjadual dengan terapi okupasi agar dapat meningkatkan kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasi dan penurunan tanda dan gejala halusinasi pendengaran.

.....Hallucinations are sensory perceptions in the absence of external stimuli that can involve sensory modalities. Auditory hallucinations are the most common symptom in patients with schizophrenia, which is about 59%. Impacts on individuals with auditory hallucinations include feeling depressed by the disturbing nature of sounds, becoming angry, depressed, unable to follow daily activities, reduced quality of life, low self-esteem, and poor social and emotional functioning. The purpose of writing this final scientific paper for nurses is to determine the application of scheduled activities with leisure time occupational therapy in patients with sensory disturbances in the perception of auditory hallucinations to reduce auditory hallucinations symptoms. Nursing interventions are carried out by implementing scheduled activities with leisure time occupational therapy, namely flower arrangement. The application of scheduled activity intervention with leisure time occupational therapy in patients with sensory disturbances in perception of auditory hallucinations can reduce symptoms of hallucinations, as seen from the results of the hallucination rating scale for those who get results of 8 during the implementation of scheduled activity interventions and after scheduled activities with leisure time occupational therapy gets results 1. This scientific study is expected to increase the motivation and creativity of nurses to apply nursing care to patients with auditory hallucinations, especially the implementation of scheduled activities with occupational therapy in order to improve the patient's ability to control hallucinations and decrease signs and symptoms of auditory hallucinations.