

[Efek Hiperglikemia terhadap Reperfusi Miokard pada Pasien Infark Miokard Akut yang Menjalani Intervensi Koroner Perkutanprimer = The Effect of Hyperglycemia on Myocardial Reperfusion in Patients with Acute Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention., Efek Hiperglikemia terhadap Reperfusi Miokard pada Pasien Infark Miokard Akut yang Menjalani Intervensi Koroner Perkutanprimer = The Effect of Hyperglycemia on Myocardial Reperfusion in Patients with Acute Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention.]

Berlian Indriansyah Idris, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920565275&lokasi=lokal>

---

Abstrak

[Pasien dengan hiperglikemia saat mengalami infark miokard akut (IMA) diketahui memiliki prognosis yang lebih buruk dibanding pasien normoglikemia, terlepas dari apakah mereka diketahui memiliki diabetes sebelumnya atau tidak. Selain itu, pasien dengan hiperglikemia mengalami luaran yang lebih buruk setelah menjalani intervensi koroner perkutan primer (IKKP). Ishihara dkk. melaporkan kematian di rumah sakit yang lebih tinggi pada pasien dengan hiperglikemia, dan tidak ada perbedaan kematian yang bermakna antara pasien diabetes dengan nondiabetes., Pasien dengan hiperglikemia saat mengalami infark miokard akut (IMA) diketahui memiliki prognosis yang lebih buruk dibanding pasien normoglikemia, terlepas dari apakah mereka diketahui memiliki diabetes sebelumnya atau tidak. Selain itu, pasien dengan hiperglikemia mengalami luaran yang lebih buruk setelah menjalani intervensi koroner perkutan primer (IKKP). Ishihara dkk. melaporkan kematian di rumah sakit yang lebih tinggi pada pasien dengan hiperglikemia, dan tidak ada perbedaan kematian yang bermakna antara pasien diabetes dengan nondiabetes., Pasien dengan hiperglikemia saat mengalami infark miokard akut (IMA) diketahui memiliki prognosis yang lebih buruk dibanding pasien normoglikemia, terlepas dari apakah mereka diketahui memiliki diabetes sebelumnya atau tidak. Selain itu, pasien dengan hiperglikemia mengalami luaran yang lebih buruk setelah menjalani intervensi koroner perkutan primer (IKKP). Ishihara dkk. melaporkan kematian di rumah sakit yang lebih tinggi pada pasien dengan hiperglikemia, dan tidak ada perbedaan kematian yang bermakna antara pasien diabetes dengan nondiabetes.]