

Benarkah Pengalaman Traumatic dapat Mendorong Perilaku Bunuh Diri pada Remaja? (Analisis Data Global School-based Student Health Survey Indonesia 2015) = Is that Traumatic Experiences Encourage Suicidal Behaviour in Adolescent? (Analysis of Global School-based Student Health Survey Indonesia 2015)

Nabila Febby Yeni, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920569601&lokasi=lokal>

Abstrak

Bunuh diri merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi satu dari dua puluh penyebab kematian tertinggi di dunia. Bunuh diri dapat terjadi disemua kalangan termasuk remaja, yang mana menjadi penyebab kemarian ketiga setelah HIV dan kecelakaan. Salah satu faktor utama penyebab bunuh diri pada remaja adalah peristiwa traumatis yang pernah dialami remaja, khususnya kekerasan fisik. Penelitian ini membahas hubungan kekerasan fisik dengan percobaan bunuh diri pada remaja usia sekolah menengah di Indonesia tahun 2015. Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data Global School-based Student Health Survey Indonesia 2015. Sampel penelitian ini adalah remaja usia 12 hingga 17 tahun. Hasil analisis multivariabel dengan regresi logistik berganda menunjukkan bahwa remaja yang mengalami kekerasan fisik akan berisiko 2,6 kali lebih tinggi melakukan percobaan bunuh diri dibanding mereka yang tidak mengalami kekerasan setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, jenis kelamin, dan kepemilikan teman dekat. Selain itu, ditemukan bahwa remaja usia SMA yang mengalami kekerasan fisik lebih berisiko melakukan percobaan bunuh diri dibanding remaja usia SMP. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu dilibatkan dalam pengembangan kurikulum kesehatan mental di sekolah dan materi edukasi kesehatan mental perlu diperbanyak dan dipublikasikan di tempat yang dapat dijangkau remaja.

.....Suicide is a public health problem that is one of the top twenty causes of death in the world. Suicide can occur in all circles, including adolescents, which is the third leading cause of death after HIV and accidents. One of the main factors causing suicide in adolescents is traumatic event, especially physical violence. This study examined about the relationship between physical violence and suicide attempts in high school-aged adolescents in Indonesia. The study design used was cross-sectional and using data from the Global School-based Student Health Survey Indonesia 2015. The sample of this study was adolescent aged 12 to 17 years. The results of multivariable logistic regression model showed that adolescents who experienced physical violence would have a 2.6 times higher risk of attempting suicide than adolescent who had never experienced violence after adjusting for counfounder variables. In addition, it was found that high school age adolescents who experienced physical violence were more likely to attempt suicide than junior high school age adolescents. The results suggest that the government needs to be involved in developing mental health curricula in schools and mental health education materials need to be reproduced and published in places accessible to youth